



## Unsere Empfehlung für Ihre Praxis:



### Chlorhexamed® PRAXIS alkoholfrei 0,2% 600 ml

- zuverlässige Keimzahlsenkung mit nur 10 ml je Anwendung
- ohne Farbstoffe
- ohne Alkohol

Profitieren Sie von unserem Angebot:

18 x 600 ml Gebinde  
Ideal für Ihren Praxisbedarf!

- nur 3,06 € pro 600 ml-Flasche
- versandkostenfrei

Passende  
Pumpe gratis  
erhältlich!

#### Nur zur Verwendung in der Zahnarztpraxis.

**Chlorhexamed® PRAXIS 0,2% Lösung zur Anwendung in der Zahnheilkunde.** **Wirkstoff:** Chlorhexidinbis(D-gluconat). **Zusammensetzung:** 100 ml Lösung enthalten 0,2 g Chlorhexidinbis(D-gluconat) sowie Pfefferminzaroma, Macroglycylglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.), Glycerol, Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend) (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Chlorhexamed® PRAXIS 0,2% ist ein Mundhöhlenantiseptikum zur Anwendung in der Zahnheilkunde durch den Zahnarzt. Zur vorübergehenden Keimzahlverminderung im Rahmen von zahnmedizinischen Eingriffen im Mundraum. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Nicht bei Säuglingen und Kindern bis zu 2 Jahren (Laryngospasmus). Nicht bei Patienten mit Asthma bronchiale oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen (Inhalation von Chlorhexamed® PRAXIS 0,2% kann zur Bronchokonstriktion führen). Bei Ulzerationen und erosiv-desquamativen Veränderungen der Mundschleimhaut. Nur zur Anwendung in der Mundhöhle. Nicht schlucken! Besondere Vorsicht bei Personen bei denen anzunehmen ist, dass die Mundspüllösung möglicherweise geschluckt wird (unter anderem Kinder unter 6 Jahren). Bei Kindern unter 12 Jahren Chlorhexamed® PRAXIS 0,2% erst nach Rücksprache mit dem Arzt oder Zahnarzt anwenden. Nicht ins Auge, die Augenumgebung oder in den Gehörgang bringen. Bei versehentlichem Kontakt mit Auge, Augenumgebung oder Gehörgang mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Intensivpflegepatienten Kontakt zur Gehirnhaut und zum Zentralnervensystem vermeiden. **Nebenwirkungen:** Häufig: reversible Beeinträchtigung des Geschmackempfindens, reversibles Taubheitsgefühl der Zunge, reversible Verfärbungen der Zahnhartgewebe, reversible Verfärbungen von Restaurationen (u. a. Füllungen) und der Zungenpapillen. Gelegentlich: brennendes Gefühl auf der Zunge zu Beginn der Behandlung. Selten: Überempfindlichkeitsreaktionen (u. a. Urtikaria, Erythem, Pruritus), verstärkte Zahnsteinbildung, reversible desquamative Veränderungen der Mukosa, reversible Parotisschwellung, Sialadenose, Zahnfleischblutung. Sehr selten: anaphylaktischer Schock. Nicht bekannt: verzögerte Wundheilung. Nebenwirkungen verschwinden gewöhnlich mit fortgesetzter Anwendung. Verfärbungen kann zum Teil durch sachgemäße Anwendung entsprechend der Dosierungsanleitung sowie einem reduzierten Rotwein-, Kaffee- oder Teekonsum vorgebeugt werden. Bei Vollprothesen empfiehlt sich ein Spezialreiniger. **Warnhinweis:** Enthält Macroglycylglycerolhydroxystearat, Pfefferminzaroma.

**Chlorhexamed® 1% GEL.** **Wirkstoff:** Chlorhexidinbis(D-gluconat). **Zusammensetzung:** 50 g Gel enthalten 0,5 g Chlorhexidinbis(D-gluconat) sowie 2-Propanol, Hyprollose, Natriumacetat, Macroglycylglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser, Levomenthol, Pfefferminzöl. **Anwendungsgebiete:** Chlorhexamed® 1% GEL wird ausschließlich im Bereich der Mundhöhle angewandt zur vorübergehenden unterstützenden Behandlung bei bakteriell bedingten Zahnfleischentzündungen (Gingivitis), zur Unterstützung der Heilungsphase nach parodontalchirurgischen Eingriffen, bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit, z. B. als Folge orthodontischer (kieferorthopädischer) Behandlungen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Chlorhexidin oder einen sonstigen Bestandteil. Nicht anwenden auf schlecht durchblutetem Gewebe. Außerdem dürfen Sie Chlorhexamed® 1% GEL nicht ins Auge, die Augenumgebung oder in den Gehörgang bringen. Des Weiteren sollte Chlorhexamed® 1% GEL nicht bei Wunden und Geschwüren (Ulzerationen) sowie oberflächlichen nicht-blutenden Abschilferungen der Mundschleimhaut (erosiv-desquamative Veränderungen) eingesetzt werden. Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen oder Untersuchungen zur Sicherheit einer Anwendung von Chlorhexidin, dem Wirkstoff in Chlorhexamed® 1% GEL, in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Deshalb sollte Chlorhexamed® 1% GEL nur unter besonderer Vorsicht angewendet werden. **Nebenwirkungen:** Selten treten Überempfindlichkeitsreaktionen gegen Chlorhexidin auf. In Einzelfällen wurden auch schwerwiegende allergische Reaktionen bis hin zur Anaphylaxie nach lokaler Anwendung von Chlorhexidin beschrieben. In Einzelfällen ist eine Abschuppung der Mundschleimhaut möglich, die jedoch nach dem Absetzen des Gels vollständig zurückgeht. Bei Beginn der Behandlung kann ein brennendes Gefühl auf der Zunge auftreten. Es können eine Beeinträchtigung des Geschmackempfindens und ein Taubheitsgefühl der Zunge auftreten. Diese Erscheinungen verbessern sich üblicherweise im Laufe der Anwendung von Chlorhexamed® 1% GEL. Es kann zu gelb-bräunlichen Verfärbungen an Zunge, Zähnen und Restaurationen (Füllungen, Zahnersatz) kommen. Auf der Zunge verschwinden sie nach Absetzen der Behandlung, an den Zähnen und Zahnfüllungen sind sie durch Zahnbürsten mit einer üblichen Zahnpasta jeweils vor der Anwendung von Chlorhexamed® 1% GEL weitgehend zu vermeiden. Spülen Sie Mundhöhle und Zahnbürste zwischendurch gründlich mit Wasser aus. Durch einen reduzierten Konsum von Tee, Kaffee oder Rotwein kann diesen Erscheinungen vorgebeugt werden. **Warnhinweis:** Enthält Macroglycylglycerolhydroxystearat, Zimt, Levomenthol und Ponceau 4R (E 124).

**Weitere Informationen siehe Fachinformation.** Nebenwirkungsmeldungen richten Sie bitte ggf. an 0800/664 56 26 oder [unternehmen@gsk-consumer.de](mailto:unternehmen@gsk-consumer.de).



Passende  
Pumpe gratis  
erhältlich!



## Unser Angebot für Ihre Praxis

**18 x 600 ml Gebinde**  
Ideal für Ihren Praxisbedarf!

- ▼ nur 3,06 € pro 600 ml-Flasche
- ▼ versandkostenfrei

ARTIKEL-NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	NETTOPREIS JE STÜCK IN €	PREIS 18 X 600 ML IN € (OHNE MWST)	ANZAHL 18ER GEBINDE
60000000031886	Chlorhexamed® PRAXIS alkoholfrei 0,2 % 600 ml	<b>3,06</b>	<b>55,08</b>	
2007000044	Pumpe für Chlorhexamed® 600 ml	<b>gratis</b>	----	----

ARTIKEL-NR.	ARTIKELBEZEICHNUNG	NETTOPREIS JE STÜCK IN €	ANZAHL DER PRODUKTE
60000000008310	Chlorhexamed® 1% GEL 50 g	<b>3,68</b>	

Mindestbestellwert 50 €. Angebot gültig ab Mai 2015.

Bestellen Sie auch gleich Ihre kostenlosen **Chlorhexamed® Empfehlungsböcke!**



Für kostenfreie Exemplare einfach ankreuzen!

Artikel-Nr. 4708



**NEUES DESIGN!**

Praxisstempel/Anschrift          Unterschrift  Datum	Zahlungsmodalitäten <input type="radio"/> Rechnung <input type="radio"/> Bankeinzug  IBAN  BIC  BLZ  Konto-Nr.  Name und Ort der Bank  Kontoinhaber  <small>Wir ermächtigen das Unternehmen GlaxoSmithKline GmbH &amp; Co. KG, Bühl, widerruflich, den Gegenwert ihrer Rechnungen ab dem 10. Tag nach Rechnungsdatum unter Abzug von 2 % Skonto mittels Lastschrift zu Lasten unseres Kontos einzuziehen. Gutschriften erhalten wir zu den selben Konditionen auf unser Konto überwiesen. Liefer- und Zahlungsbedingungen laut aktueller Preisliste.</small>
--	---